Guía de **medicamentos homeopáticos** de uso frecuente

11ª Edición

BOIRON®

Foto portada: E. Frey-agence naturine

TRASTORNOS ANÍMICOS - TRASTORNOS DEL SUEÑO
ANSIEDAD-ESTRÉS • CANSANCIO • INSOMNIO — IR

TRASTORNOS CIRCULATORIOS
ESTADOS COLESTEROLÉMICOS • HEMORROIDES • INSUFICIENCIA VENOSA • TRASTORNOS DEL RITMO CARDIACO • OTROS — IR

TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS
ACNÉ • DERMATITIS • INFLAMACIÓN AGUDA • PICADURAS • SABAÑONES • VERRUGAS • OTROS — IR

TRASTORNOS DIGESTIVOS
CÓLICOS DEL LACTANTE • TRASTORNOS DIGESTIVOS • TRASTORNOS HEPATOBILIARES • TRASTORNOS INTESTINALES • TRASTORNOS VERMINOSOS — IR

TRASTORNOS GINECOLÓGICOS
NÁUSEAS DEL EMBARAZO • PREPARACIÓN AL PARTO • POSTPARTO • TRASTORNOS DURANTE LA MENOPAUSIA • TRASTORNOS DURANTE LA REGLA • VAGINITIS • OTROS — IR

TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES
CANSANCIO FÍSICO • DESCALCIFICACIÓN • DOLORES ARTICULARES • TRAUMATISMOS — IR

TRASTORNOS RESPIRATORIOS
ALERGIAS • DOLOR DE GARGANTA • GRIPE • RINITIS • SINUSITIS • TOS • OTROS — IR

TRASTORNOS URINARIOS
INFECCIÓN URINARIA — IR

OTRAS PATOLOGÍAS
AFECCIONES BUCOFARÍNGEAS • AFTAS • CEFALEAS • CINETOSIS • DENTICIÓN • HEMORRAGIAS • HIPERGLUCEMIA • INSOLACIÓN • PREOPERATORIO • POSTOPERATORIO — IR

INFORMACIÓN GENERAL: MODO DE EMPLEO • ADVERTENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICES: ÍNDICE POR PATOLOGÍAS • ÍNDICE POR ORDEN ALFABÉTICO • ÍNDICE DE COMPOSÉS • ÍNDICE DE POMADAS — IR

Ansiedad. Estrés

SEDATIF PC

Trastornos emocionales y de ansiedad que puedan venir acompañados de posibles trastornos del sueño.



Comprimidos: caja de 40

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día.

Composición:

Aconitum napellus 6 CH, Belladonna 6 CH, Calendula officinalis 6 CH, Chelidonium majus 6 CH, Abrus precatorius 6 CH, Viburnum opulus 6 CH.

Excipientes:

Sacarosa (0,225 g), lactosa (0,072 g), estearato magnésico. c.s.p. comprimido de 0,30 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SEDATIF PC (Gránulos)

Trastornos emocionales y de ansiedad que puedan venir acompañados de posibles trastornos del sueño.

Gránulos: 2 tubos de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Aconitum napellus 6 CH, Belladonna 6 CH, Calendula officinalis 6 CH, Chelidonium majus 6 CH, Abrus precatorius 6 CH, Viburnum opulus 6 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Ansiedad. Estrés

ARGENTUM NITRICUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de nerviosismo por anticipación, con precipitación y agitación. Diarrea emotiva.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Argentum nitricum 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de ansiedad con bloqueo ante un examen, prueba, intervención o acontecimiento. Diarrea emotiva.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos la víspera del acontecimiento, 5 gránulos una hora antes y 5 gránulos en el momento del acontecimiento.

Composición:

Gelsemium sempervirens 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cansancio

IGNATIA AMARA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de ansiedad con espasmos. Comportamiento paradójico. Hipersensibilidad. Insomnio.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos la víspera del acontecimiento, 5 gránulos una hora antes y 5 gránulos en el momento del acontecimiento.

Composición:

Ignatia amara 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

ACIDUM PHOSPHORICUM COMPOSÉ

Tratamiento del cansancio físico e intelectual.

Gotas: frasco de 30 ml
Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

- **Gotas:**
  20 gotas 3 veces al día con un poco de agua.
- **Gránulos:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Acidum phosphoricum 3 CH, Kalium phos-phoricum 3 CH, Anacardium orientale 3 CH, Arnica montana 3 CH, Gelsemium sempervirens 3 CH, Selenium metallicum 3 CH, Argentum nitricum 3 CH, Avena sativa 3 DH.

Excipientes: Gotas: etanol al 30% V/V - Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: 20 gotas (0,5 ml) contienen 0,12 g. de etanol. (Ver ⓘ).

Cansancio

CEREALES GERMINADOS

Reconstituyente.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Triticum sativum germinatum, Hordeum sativum germinatum, Avena sativa germinata, Gentiana lutea, Menyanthes trifoliata. En gránulos: dilución 4 CH.

Excipientes:

Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insomnio

PASSIFLORA COMPOSÉ Jarabe

Trastornos pasajeros del sueño y del nerviosismo diurno asociado.

Jarabe: frasco de 125 ml

Posología y forma de administración:

5 ml 3 veces al día.

Composición:

Passiflora 3 DH, Ignatia amara 4 DH, Coffea cruda 5 CH, Nyckterinia capensis 4 CH, Tellurium 5 CH, Acidum phosphoricum 7 CH, Palladium 5 CH, Magnesium 5 CH a.a.

Excipientes:

Agua purificada, jarabe simple, glicerina, xilitol, sorbitol líquido E-240, aroma de vainilla, nipagina, caramelo, nipasol y colorante amarillo de quinoleina E-104 c.s.p. 125 ml.

Advertencias: 5 ml de PASSIFLORA COMPOSÉ BOIRON jarabe contienen 0,98 g de sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. PASSIFLORA COMPOSÉ BOIRON jarabe contiene sorbitol líquido (E-420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Por contener nipagina (E-219) y nipasol (E-216) puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

Insomnio

PASSIFLORA COMPOSÉ

Trastornos pasajeros del sueño y del nerviosismo diurno asociado.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos
Comprimidos: caja de 50

Posología y forma de administración:

- **Gránulos:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.
- **Comprimidos:**
  Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día, reduciendo las tomas según vaya notando que mejora.

Composición: Passiflora incarnata 3 DH, Ignatia amara 4 CH, Coffea cruda 5 CH, Nyckterinia 4 CH, Tellurium metallicum 5 CH, Phosphoricum acidum 7 CH, Palladium metallicum 5 CH, Magnesium metallicum 5 CH.

Excipientes: Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.
Comprimidos: sacarosa (0,02 g), lactosa (0,18 g), estearato magnésico.

Advertencia: (Ver ⓘ).

HOMEOGENE 46

Tratamiento de problemas ligeros del sueño, alteraciones nerviosas leves, irritabilidad y estados leves de ansiedad.



Comprimidos: caja de 60

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día.

Composición:

Stramonium 3 DH, Hyoscyamus niger 3 DH, Passiflora incarnata 3 DH, Ballota foetida 3 DH, Nux moschata 4 CH - a.a.1,2 mg.

Excipientes:

Sacarosa (0,189 g), goma arábica, talco, estearato magnésico. c.s.p. 1 comprimido de 0,2 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insomnio

COFFEA CRUDA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de insomnio por hiperactividad mental, afluencia continua de pensamientos, excitación intelectual. Insomnio tras recibir una buena noticia.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos una hora antes de acostarse.

Composición:

Coffea cruda 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

KALIUM BROMATUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de terrores nocturnos con agitación y ansiedad.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos una hora antes de acostarse y 5 gránulos al acostarse.

Composición:

Kalium bromatum 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insomnio

NUX VOMICA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de dificultad para dormir, insomnio por sobreactividad y estrés. Desvelo sobre las tres de la mañana.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos por la noche.

Composición:

Nux vomica 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

STRAMONIUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de insomnio debido a terrores nocturnos con miedo a la oscuridad.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos una hora antes de acostarse y
5 gránulos al acostarse.

Composición:

Stramonium 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Estados colesterolémicos

STRONTIUM COMPOSÉ

Estados de hipercolesterolemia.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Strontium metallicum 5 CH, Tantalum metallicum 5 CH, Osmium metallicum 5 CH, Ganglion grand sympathique 5 CH, Cholesterolum 5 CH, Chaerophyllum sativum TM.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

CHOLESTERINUM 15 CH*

Frecuentemente utilizado en estados hipercolesterolémicos con depósitos de colesterol (iris, piel).

Tubo-dosis de 1 g de glóbulos

Posología y forma de administración:

Tomar el contenido entero de 1 dosis 1 vez a la semana.

Composición:

Cholesterinum 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada tubo-dosis de 1 gramo contiene 0,85 g de sacarosa y 0,15 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Hemorroides

AESCULUS COMPOSÉ

Hemorroides y trastornos de la circulación venosa.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Aesculus hippocastanum TM 33,33 g, Hamamelis virginiana TM 33,33 g, Hydrastis canadensis TM 16,66 g, Viburnum prunifolium TM c.s.p. 100 g.

Excipientes: Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

AVENOC

Tratamiento de las hemorroides que se manifiestan por crisis dolorosas, prurito y pequeños sangrados.

Pomada: envase de 30 g
Tubo con cánula rectal

Posología y forma de administración:

Aplicar la pomada de 3 a 4 veces al día, después del aseo local de la zona afectada. Seguir el tratamiento algunos días tras la desaparición completa de los síntomas. La aplicación intrarectal se facilita con la utilización de la cánula que se adjunta.

Composición:

Ficaria verna TM 0,01 g, Paeonia officinalis TM 0,01 g, Adrenalinum 3 DH 0,05 g, Amileina clorhidrato 1 DH 5 g.

Excipientes:

Lanolina, vaselina c.s.p. 100 g.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Es necesario consultar a su médico si no se observa mejoría al cabo de algunos días, particularmente si la crisis se agrava o repite. La administración de este medicamento no dispensa del seguimiento de una higiene ni de una dieta adecuada.

Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene lanolina. (Ver ⓘ).

Hemorroides

AVENOC

Tratamiento de las hemorroides que se manifiestan por crisis dolorosas, prurito y pequeños sangrados.



Supositorios: caja de 10 supositorios

Posología y forma de administración:

Aplicar 1 supositorio por la mañana y otro por la noche, después del aseo local.

Composición:

Paeonia officinalis 1 DH 0,01 g, Ratanhia 3 CH 0,01 g, Aesculus hippocastanum 3 CH 0,01 g, Hamamelis virginiana 1 DH 0,01 g.

Excipientes:

Glicéridos semisintéticos sólidos c.s.p. 1 supositorio de 3 g.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Es necesario consultar a su médico si no se observa mejoría al cabo de algunos días, particularmente si la crisis se agrava o repite. La administración de este medicamento no dispensa del seguimiento de una higiene ni de una dieta adecuada (Ver ⓘ).

AESCULUS
HIPPOCASTANUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de congestión venosa hemorroidal con sensación de pesadez. Hemorroides con prurito.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Aesculus hippocastanum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Hemorroides

PAEONIA OFFICINALIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de hemorroides con fisuras anales con dolor durante la deposición.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día. Frecuentemente se alterna con Ratanhia.

Composición:

Paeonia officinalis 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RATANHIA OFFICINALIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de hemorroides con fisuras anales, con dolores agudos y punzantes. Estreñimiento con constricción anal.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día. Frecuentemente se alterna con Paeonia.

Composición:

Ratanhia officinalis 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insuficiencia venosa

HAMAMELIS TM

Tratamiento de varices y hemorroides.

Pomada: tubo de 50 g

Posología y forma de administración:

Aplicar una fina capa de pomada sobre la zona de la piel afectada. Aplicar la pomada de 2 a 3 veces al día. Vía externa.
Uso cutáneo.

Composición:

Hamamelis virginiana TM 4 g.

Excipientes: Vaselina c.s.p. 100 g.

Advertencias: (Ver ⓘ).

HAMAMELIS COMPOSÉ*

Trastornos de la circulación venosa: piernas cansadas, varices.

Gotas: frasco de 30 ml
Gránulos: tubo de 4 g de gránulos
Comprimidos: caja de 50

Posología y forma de administración:

- **Gotas:**
  20 gotas 3 veces al día con un poco de agua.
- **Gránulos:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.
- **Comprimidos:**
  Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día, reduciendo las tomas según vaya notando que mejora.

Composición:

Hamamelis virginiana 3 CH, Anemone pulsatilla 3 CH, Echinacea angustifolia 3 CH, Fluoricum acidum 3 CH, Viburnum prunifolium 3 CH, Tussilago farfara 3 CH, Corylus avellana 3 DH, Aesculus hippocastanum 3 DH.

Excipientes: Gotas: etanol al 30% V/V - Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa. - Comprimidos: sacarosa (0,02 g), lactosa (0,18 g), estearato magnésico.

Advertencias: 20 gotas (0,5 ml) contienen 0,12 g. de etanol. (Ver ⓘ).

Insuficiencia venosa

HAMAMELIS VIRGINIANA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de congestión venosa agravada por los movimientos. Varices.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Hamamelis virginiana 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

PULSATILLA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de piernas cansadas y dilatación venosa que empeora con el calor y la inmovilidad.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Pulsatilla 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insuficiencia venosa

FLUORICUM ACIDUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de úlceras varicosas superficiales con prurito intenso.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Fluoricum acidum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

STROPHANTHUS COMPOSÉ

Tónico y sedativo cardíaco.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Strophanthus hispidus 3 DH, Aurum muriaticum natronatum 2 CH, Camphora 2 DH, Valeriana officinalis TM, Cactus grandiflorus 1 DH, Crataegus oxyacantha 4 CH, Aether 2 DH.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos del ritmo cardiaco

LYCOPUS VIRGINICUS 7 CH*

Frecuentemente utilizado como tratamiento complementario en caso de taquicardia y palpitaciones.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Lycopus virginicus 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Otros

VIPERA REDI 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de inflamación vascular superficial.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Vipera redi 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Acné

EUGENIA JAMBOSA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de acné y acné menstrual. Comedón.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Eugenia jambosa 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SANGUINARIA CANADENSIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de acné rosácea en las mejillas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Sanguinaria canadensis 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dermatitis

GRAPHITES 7 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de eczema en pliegues y uniones cutaneomucosas, con secreciones de apariencia melosa y que sangran fácilmente. Cicatrices queloides.

Gránulos: tubo de 4 de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Graphites 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

MEZEREUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en eczemas con secreciones vesiculosas amarillentas y con costras espesas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Mezereum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dermatitis

SAPONARIA COMPOSÉ

Tratamiento de la dermatosis.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Saponaria officinalis 3 DH, Fumaria officinalis 3 DH, Sarsaparilla 3 DH, Hydrocotyle asiatica 3 DH, Viola tricolor 3 CH, Rhus vernix 3 CH, Lappa major 3 CH, Berberis vulgaris 3 CH.

Excipientes:

Gránulos: sacarosa, lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Inflamación aguda

NITRICUM ACIDUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en grietas o fisuras con bordes netos lineales y con fondo sangrante.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Nitricum acidum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Inflamación aguda

CREMA CALENDULA TM

Calmante en irritaciones de la piel y para favorecer la cicatrización.

Crema: tubo de 40 g

Posología y forma de administración:

Aplicar una ligera capa en toda la zona afectada. Repetir varias veces al día en caso necesario.

Composición:

Calendula officinalis TM 4 g.

Excipientes:

Agua purificada, palmitoestearato de etilenglicol a.e., parafina líquida ligera, glicéridos poliglicolizados saturados, ácido sórbico E-200, p-hidroxibenzoato de metilo sodado E-219 c.s.p. 100 g.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: No aplicar sobre heridas abiertas

Advertencias sobre excipientes: CALENDULA TM crema por contener ácido sórbico (E-200) puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto). Por contener parahidroxibenzoato de metilo sodado (E-219) puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). (Ver ⓘ)

HOMEOPLASMINE

Irritaciones de la piel.

Pomada: tubo de 40 g

Posología y forma de administración:

Aplicar una capa fina en la zona afectada de 1 a 3 veces al día.

Composición:

Calendula officinalis TM 0,1 g, Phytolacca decandra TM 0,3 g, Bryonia dioica TM 0,1 g, Benzoe TM 0,1 g , Acido bórico 3 g.

Excipientes:

Vaselina c.s.p. 100 g.

Contraindicaciones: No utilizar en niños menores de 3 años. No aplicar en lesiones infectadas o supurantes.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Por contener ácido bórico, este medicamento no debe utilizarse de forma prolongada ni repetida, sobre piel lesionada (principalmente piel escoriada y quemaduras), sobre una superficie extensa ni con vendajes oclusivos, particularmente en niños. Embarazo y lactancia: No aplicar en los senos durante la lactancia. (Ver ⓘ)

Inflamación aguda

CICADERMA

Alivio de la irritación de la piel: pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, picaduras de insectos, eritemas y rasguños.

Pomada: tubo de 40 g

Posología y forma de administración:

Aplicar la pomada de 1 a 3 veces al día en capa fina sobre la piel irritada, después de limpiar la zona afectada.

Composición:

Vaselina por digestión de Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium (2/1/1:10) 97 g, Ledum palustre TM 1,5 g para 100 g de pomada.

Excipientes:

Vaselina, etanol 60% V/V.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:
CICADERMA contiene Hypericum, por lo que debe evitarse la exposición al sol de las zonas impregnadas con la pomada por el riesgo de fotosensibilización. No aplicar en lesiones infectadas y supurantes. (Ver ⓘ)

BELLADONNA 7 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de quemaduras leves y de primer grado.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Belladonna 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Inflamación aguda Picaduras

CANTHARIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de quemaduras de segundo grado y ampollas ardientes en los pies (marcha, deporte).

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Cantharis 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

APIS MELLIFICA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de picaduras de insectos con edema y prurito, que se alivia con las aplicaciones de agua fría.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Apis mellifica 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Picaduras

LEDUM PALUSTRE 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de picaduras de insectos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Ledum palustre 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Sabañones

POMADA AGARICUS TM

Sabañones.

Pomada: tarro de 50 g

Posología y forma de administración:

2 ó 3 aplicaciones al día.

Composición:

Agaricus TM 4 g.

Excipiente:

Vaselina c.s.p. 100 g.

Sabañones

PULSATILLA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de eritema en las extremidades causado por el frío. Sabañones.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Pulsatilla 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Verrugas

THUYA OCCIDENTALIS 7 CH*

Frecuentemente utilizado en el tratamiento de fondo de las verrugas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 1 vez al día.

Composición:

Thuya occidentalis 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Otros

SECALE CORNUTUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado como tratamiento complementario en caso de escaras del decúbito.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Secale cornutum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

URTICA URENS 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de urticarias alérgicas o tóxicas con edema, que empeoran con el agua fría.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Urtica urens 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cólicos del lactante

NUX VOMICA COMPOSÉ

Tratamiento de los síntomas asociados al cólico infantil y a las digestiones difíciles.

Gotas: frasco de 125 ml
Gránulos: tubo de 4 g de gránulos



Posología y forma de administración:

Gotas: Administrar una cucharada aproximadamente de 1,25 ml cada 15-20 minutos desde la aparición de los síntomas, hasta 3 tomas. Repetir las tomas 2 ó 3 veces al día si fuese necesario. Si los cólicos aparecen cada día a la misma hora, administrar 1 ml unos minutos antes.
Gránulos: 5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Nux vomica 3 CH, Bryonia dioica 3 CH, Argentum nitricum 3 CH, Condurango 3 CH, Abies nigra 3 CH, Robinia pseudoacacia 3 CH, Solidago 3 DH.

Excipientes:

Gotas: metilparaben sódico (E-219) (0,109g), propilparaben (E-216) (0,011g), xylitol (E-967) (32,75g), sorbitol (E-420) (10,92g), glicerol (E-422) (10,92g), aroma de plátano (0,328g), colorante amarillo de quinoleina (E-104) (0,001g) y agua purificada c.s.p. 125 ml.
Gránulos: Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa. (Ver ⓘ).

Advertencias sobre excipientes: NUX VOMICA COMPOSÉ gotas 125 ml puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene metilparaben sódico (E-219) y propilparaben (E-216). NUX VOMICA COMPOSÉ gotas 125ml contiene sorbitol (E-420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento.

AETHUSA CYNAPIUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de intolerancia láctea con calambres, espasmos y dolores abdominales que no se calman en los brazos. Vómitos y diarrea con heces verdosas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 a 4 veces al día durante 15 días.

Composición:

Aethusa cynapium 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cólicos del lactante

COLOCYNTHIS 30 CH*

Frecuentemente utilizado en lactantes mal comedores, con dolor y llanto "a ráfagas" y que mejora al presionarle el abdomen, con calor e inclinándole hacia delante.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos



Posología y forma de administración:
5 gránulos de 3 a 4 veces al día durante 15 días.

Composición:
Colocynthis 30 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

NUX VOMICA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en lactantes frioleros, irritables, estreñidos y con lengua saburral en su raíz.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos de 3 a 4 veces al día durante 15 días.

Composición:
Nux vomica 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos digestivos

GASTROCYNESINE

Trastornos digestivos que cursan con pesadez de estómago, somnolencia o regurgitaciones.



Comprimidos: caja de 60

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca 2 comprimidos 15 minutos antes de las comidas. Repetir la toma en caso de necesidad después de las comidas.

Composición:

Abies nigra 4 CH, Carbo vegetabilis 4 CH, Nux vomica 4 CH, Robinia pseudoacacia 4 CH - a.a.

Excipientes:

Sacarosa (0,225 g), lactosa (0,072 g), estearato magnésico. c.s.p. 1 comprimido de 0,30 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

NUX VOMICA COMPOSÉ

Tratamiento de problemas dispépticos de origen gástrico.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Nux vomica 3 CH, Bryonia 3 CH, Argentum nitricum 3 CH, Condurango 3 CH, Abies nigra 3 CH, Robinia pseudoacacia 3 CH, Solidago virga aurea 3 DH.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencias: (Ver ⓘ).

Trastornos digestivos

ANTIMONIUM CRUDUM 7 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de indigestión, diarrea por excesos alimentarios. Lengua con una capa blanca (saburra).

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Antimonium crudum 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

CARBO VEGETABILIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de aerofagia y/o pesadez de estómago provocadas por el alcohol y los alimentos grasos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Carbo vegetabilis 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

NUX VOMICA 7 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de molestias digestivas por excesos alimentarios, de alcohol, de café o tabaco. Pesadez gástrica.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
Nux vomica 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

ROBINIA PSEUDOACACIA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de acidez gástrica y pirosis.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Robina pseudoacacia 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos hepatobiliares

CHELIDONIUM COMPOSÉ

Drenaje hepático en los problemas de origen hepatobiliar.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Chelidonium majus 3 DH, Taraxacum dens leonis 3 DH, Carduus marianus 3 DH, Solidago virga aurea 3 DH, China rubra 3 CH, Hydrastis canadensis 3 CH, Magnesia muriatica 3 CH.

Excipientes: Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RICINUS COMPOSÉ

Tratamiento de la insuficiencia biliar.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

- **Gránulos:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición: Ricinus communis 3 CH, Citrullus colocynthis 3 CH, Berberis vulgaris 3 CH, Hydrastis canadensis 3 CH, Lithium carbonicum 3 CH, Ptelea trifoliata 3 CH, Podophyllum peltatum 3 CH, Chamomilla vulgaris 3 CH.

Excipientes: Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos intestinales

ALOE COMPOSÉ

Trastornos intestinales con diarrea.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Aloe socotrina 3 CH, Colocynthis 3 CH, Podophyllum peltatum 3 CH, Bryonia 3 CH, Belladonna 3 CH, Arsenicum album 3 CH, Dioscorea villosa 3 CH, Magnesia phosphorica 3 CH.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

CHINA RUBRA 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de diarrea sin dolor, con agotamiento, por consumo excesivo de fruta.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

China rubra 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos intestinales

IGNATIA AMARA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de colón irritable, espasmos intestinales.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
Ignatia amara 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

PODOPHYLLUM PELTATUM 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de diarrea profusa, fétida, matutina, de origen hepático.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Podophyllum peltatum 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RICINUS COMMUNIS 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de diarrea acuosa sin cólicos, con náuseas y vómitos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 4 veces al día.

Composición:
Ricinus communis 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

CINA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de cólicos abdominales debidos a vermes (lombrices) con nerviosismo, insomnio, agitación.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
Cina 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Náuseas del embarazo

IGNATIA AMARA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de náuseas del embarazo por el olor de la comida o del tabaco y que se calman comiendo.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
Ignatia amara 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SEPIA OFFICINALIS 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de náuseas matinales del embarazo, pensando o viendo alimentos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 1 vez al día.

Composición:
Sepia officinalis 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Preparación al parto

ACTAEA RACEMOSA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en la preparación al parto. Rigidez cervical, dolor uterino. Anomalía de las contracciones con ansiedad.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Semanas 37 y 38: 5 gránulos por la mañana.
Semana 39: 5 gránulos por la mañana, mediodía y noche.
Parto: 3 gránulos cada hora hasta entrar en el paritorio (junto con caulophyllum).

Composición:

Actaea racemosa 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

CAULOPHYLLUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en la preparación al parto. Rigidez del cérvix (favorece la dilatación).

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Semanas 37 y 38: 5 gránulos por la noche.
Semana 39: 5 gránulos por la mañana, mediodía y noche.
Parto: 3 gránulos cada hora hasta entrar en el paritorio (junto con Actaea racemosa).

Composición:

Caulophyllum 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Ver también Preoperatorio (página 95)

Postparto - Episiotomía

APIS MELLIFICA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de episiotomía para evitar la formación de un edema.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día durante 5 días.

Composición:
Apis mellifica 15 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

STAPHYSAGRIA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de dolor persistente después de la episiotomía a pesar de una correcta cicatrización.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos al día durante 10 días.

Composición:
Staphysagria 15 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Ver también Postoperatorio (páginas 96-97)

Postparto-Estimulación de la subida de la leche

ALFALFA 6 DH*

Frecuentemente utilizado en caso de subida de leche insuficiente.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día, en asociación con Ricinus communis 5 CH.

Composición:
Alfalfa 6 DH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RICINUS COMMUNIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de subida de leche insuficiente.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día, en asociación con Alfalfa 6 DH.

Composición:
Ricinus communis 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Postparto

Inhibición de la subida de la leche

RICINUS COMMUNIS 30 CH*

Frecuentemente utilizado para disminuir la producción de la leche.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Ricinus communis 30 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Postparto

Subida de leche dolorosa

APIS MELLIFICA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de inflamación de los pechos durante la subida de leche.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día. Frecuentemente se alterna con Bryonia 9 CH.

Composición:

Apis mellifica 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Postparto - Subida de leche dolorosa

BRYONIA ALBA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de inflamación dolorosa de las mamas durante la subida de leche que empeora con el menor movimiento.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día. Frecuentemente se alterna con Apis 9 CH.

Composición:
Bryonia alba 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

BELLADONNA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de tumefacción, enrojecimiento, dolor de carácter púlsatil y calor intenso.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Belladonna 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Postparto

Subida de la leche dolorosa

PHYTOLACCA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de mastitis.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Phytolacca 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos durante la menopausia

CARDIOCYNESINE

Trastornos funcionales de la menopausia. Trastornos debidos a insuficiencia venosa a nivel de los miembros inferiores.



Comprimidos: caja de 50

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día, reduciendo las tomas según vaya notando que mejora.

Composición:

Actaea racemosa 4 CH, Arnica montana 4 CH, Glonoinum 4 CH, Lachesis mutus 5 CH, Sanguinaria canadensis 4 CH - a.a.

Excipientes:

Sacarosa (0,02 g), lactosa (0,18 g), estearato magnésico, c.s.p. 1 comprimido de 0,20 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos durante la menopausia

LACHESIS MUTUS 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de sofocos y modificaciones del humor en la perimenopausia. Cefalea congestiva y pulsátil (izquierda).

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Lachesis mutus 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos durante la regla

ACTAEA RACEMOSA 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de dismenorrea progresiva a lo largo de la regla, calambroidea con síndrome premenstrual.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Actaea racemosa 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos durante la regla

CAULOPHYLLUM 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de dismenorrea del primer día, rigidez del cérvix.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 4 veces al día.

Composición:
Caulophyllum 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

COLOCYNTHIS 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de dismenorrea espasmódica calambroidea que mejora con la presión y el calor, después de una contrariedad o de una emoción.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 4 veces al día.

Composición:
Colocynthis 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Trastornos durante la regla

FOLLICULINUM 15 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de síndrome premenstrual.

Tubo-dosis de 1 g de glóbulos

Posología y forma de administración:
Tomar el contenido entero de 1 dosis los días 8 y 18 del ciclo.

Composición:
Folliculinum 15 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada tubo-dosis de 1 gramo contiene 0,85 g de sacarosa y 0,15 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

LAC CANINUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de síndrome premenstrual con inflamación mamaria que alterna de un pecho a otro.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
Lac caninum 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

ENDHOMETROL

Afecciones vaginales: leucorreas, inflamación e irritación vaginal y prurito vulvar.



Óvulos: caja de 6

Posología y forma de administración:

Introducir un óvulo en la vagina, por la noche al acostarse.

Composición:

Calendula TM 0,214 g, Helonias dioica 3 DH 0,018 g, Hydrastis canadensis 3 DH 0,018 g para un óvulo de 3,5 g.

Excipientes:

Gelatina, glicerina, agua purificada.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SEPIA COMPOSÉ

Dolores e inflamación de la región pélvica.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Sepia 3 CH, Aloe socotrina 3 CH, Arnica montana 3 CH, Sanguinaria canadensis 3 CH, Collinsonia canadensis 3 CH, Paeonia officinalis 3 CH, Aesculus hippocastanum 3 DH, Hamamelis virginiana 3 DH .

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cansancio físico

CUPRUM METALLICUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de agujetas. Calambres nocturnos (de las pantorrillas), de comienzo y final bruscos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Cuprum metallicum 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Descalcificación

CALCAREA COMPOSÉ

Reconstituyente. Recalcificante.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica. Disponibles a la 6 DH ó 9 CH

Excipientes:

Sacarosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Descalcificación

JENOVERINE

Reconstituyente.
En procesos de convalecencia o desmineralización durante el crecimiento.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

- **Hasta los 3 años:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 1 vez al día.
- **De 3 a 12 años:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 2 veces al día.
- **Mayores de 12 años:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Oleum jecoris 4 CH, Calcarea carbonica 4 CH, Calcarea fluorica 4 CH, Calcarea hypophosphorosa 4 CH, Manganum nucleinicum 4 CH, Silicea 5 CH, Ferrum phosphoricum 4 CH, Sulfur (Flavum) 5 CH a.a. 0,375 g.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa. c.s.p. 100 g.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

OSTEOCYNESINE

Descalcificación. Trastornos del crecimiento en el niño. Consolidación de las fracturas. Convalecencia.



Comprimidos: caja de 60

Posología y forma de administración:

Tomar 2 comprimidos 2 ó 3 veces al día. Disolver en la boca los comprimidos, distanciándolos de las comidas.

Composición:

Calcarea ostreica 3 DH, Calcarea fluorica 3 DH, Calcarea phosphorica 3 DH, Sulfur iodatum 4 CH - a.a. 75 mg.

Excipientes:

Sacarosa (0,225 g), lactosa (0,072 g), estearato magnésico. c.s.p. 1 comprimido de 0,30 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Descalcificación

CALCAREA PHOSPHORICA 5 CH*

Frecuentemente utilizado para favorecer la consolidación de las fracturas, recalcificación.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Calcarea phosphorica 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SILICEA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de desmineralización y descalcificación con gran sensibilidad al frío.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos una vez al día.

Composición:

Silicea 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dolores articulares

ARTHRODRAINOL

Dolores músculo-articulares. Tratamiento de las afecciones reumáticas.

Gotas: frasco de 30 ml

Posología y forma de administración:

Tomar 20 gotas 3 veces al día con un poco de agua reduciendo las tomas según vaya notando que mejora.

Composición:

Arnica montana 3 CH, Bryonia dioica 6 CH, Solanum dulcamara 6 CH, Pulsatilla pratensis 3 CH, Matricaria chamomilla 12 CH, Kalium iodatum 12 CH, Rhododendron ferrugineum 12 CH, Benzoicum acidum 6 CH, Rhus toxicodendron 6 CH - aa.

Excipientes:

Etanol al 30% V/V c.s.p. 30ml.

Advertencia: 20 gotas (0,5 ml) contienen 0,12 g. de etanol. (Ver ⓘ).

RHUS
TOXICODENDRON COMPOSÉ

Tratamiento de dolores reumáticos, cansancio muscular.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Rhus toxicodendron 3 CH, Urtica urens 3 CH, Acidum benzoicum 3 CH, Acidum formicum 3 CH, Berberis vulgaris 3 CH, Ranunculus bulbosus 3 CH, Lithium carbonicum 3 CH.

Excipientes:

Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dolores articulares

APIS MELLIFICA 15 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de hinchazón de una articulación por acumulación de líquido acuoso, de instalación rápida con edema rojizo que mejora con el frío.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

En casos agudos, 5 gránulos cada 15 minutos, espaciando según mejoría. En casos subagudos o crónicos, de 2 a 4 tomas cada 24 horas.

Composición:

Apis mellifica 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

BRYONIA ALBA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de dolores articulares que empeoran con el movimiento y mejoran con el reposo y aplicaciones calientes.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada hora, espaciando según mejoría.

Composición:

Bryonia alba 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dolores articulares

RHODODENDRON 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de dolores reumáticos que empeoran antes de las tormentas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día y en el momento de los dolores.

Composición:

Rhododendron 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RHUS

TOXICODENDRON 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de dolores articulares, periarticulares, tendinosos y ligamentosos provocados por humedad y sobreesfuerzos físicos, que mejoran con el movimiento progresivo y empeoran con el inicio del movimiento y con el reposo.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Rhus toxicodendron 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RUTA GRAVEOLENS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de esguinces, luxaciones, tendinitis.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Ruta graveolens 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

ARNICA COMPOSÉ

Tratamiento de los traumatismos musculares o tendinosos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos
Comprimidos: caja de 50

Posología y forma de administración:

- **Gránulos:**
  Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.
- **Comprimidos:**
  Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día, reduciendo las tomas según vaya notando que mejora.

Composición: Arnica montana 4 CH, Calendula 4 CH, Chamomilla vulgaris 9 CH, Hypericum perforatum 30 CH, Rhus toxicodendron 9 CH, Ruta graveolens 7 CH, Calcarea phosphorica 7 CH, China rubra 7 CH - aa c.s.

Excipientes:

Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa. - Comprimidos: sacarosa (0,02 g), lactosa (0,18 g), estearato magnésico.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Traumatismos

ARNICA COMPOSITUM*

Traumatismos y contusiones.

Crema: tarro de 50 g
Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Crema: 2 ó 3 aplicaciones al día.
Gránulos: 5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Arnica 4 DH, Calendula 4 DH, Hamamelis 4 DH, Millefolium 4 DH, Belladonna 4 DH, Aconitum 4 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Hepar sulfuris 8 DH, Chamomilla vulgaris 4 DH, Symphytum 4 DH, Bellis perennis 4 DH, Echinacea angustifolia 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Hypericum 7 DH. a.a.

Excipientes:

Crema: cetaline. Gránulos: sacarosa y lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: Arnica compositum en crema contiene CETALINE por lo que puede producir irritación de la piel porque contiene estearato de propilenglicol. (Ver ⓘ).

ARNICA TM

Tratamiento local del dolor, de la inflamación y de los hematomas producidos por un traumatismo sin herida. Contusiones.

Crema: tubo de 40 g

Posología y forma de administración:

Aplicar una ligera capa en toda la zona afectada. Repetir varias veces al día en caso necesario.

Composición:

Arnica montana TM 4 g.

Excipientes:

Agua purificada, palmitoestearato de etilenglicol a.e., parafina líquida ligera, glicéridos poliglicolizados saturados, ácido sórbico E-200, p-hidroxibenzoato de metilo sodado E-219 c.s.p. 100 g.

Advertencias sobre excipientes: ARNICA TM crema por contener ácido sórbico (E-200), puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto). Por contener parahidroxibenzoato de metilo sodado (E-219) puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas), y excepcionalmente broncoespasmo.

Traumatismos

ARNICA MONTANA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de contusiones y traumatismos de todo tipo y tejido. Cansancio muscular. Daños capilares y venosos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Arnica montana 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

LEDUM PALUSTRE 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de equimosis por traumatismo (ojo negro…).

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Ledum palustre 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SYMPHYTUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado para la consolidación de fracturas y episodios dolorosos del hueso y periostio.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Symphytum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

POLLENS 30 CH

Prevención y tratamiento sintomático de la hipersensibilidad a los pólenes que forman parte de su composición, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma polínica.

Caja con 6 tubo-dosis de 1 g de glóbulos

Posología y forma de administración:

- **Prevención:**
  Tomar un tubo-dosis a la semana de febrero a octubre.
- **Tratamiento sintomático:**
  Tomar un tubo-dosis al día.

Composición:

Dilución a la 30 CH de los pólenes siguientes:

Gramíneas: Poa pratensis, Dactylis glomerata.

Árboles: Pino, Tilo, Castaño, Álamo, Sauce, Olmo, Carpe, Roble, Arce, Haya, Fresno, Plátano, Aligustre, Saúco, Ciprés, Morera, Olivo, Acacia.

Excipientes: Sacarosa y lactosa.

Sacarosa (0,85 g), lactosa (0,15 g) c.s.p.
1 tubo-dosis de 1 g de glóbulos.

Advertencia: (Ver ⓘ).

POUMON HISTAMINE 15 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de reacciones alérgicas agudas de las vías respiratorias.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos de 3 a 6 veces al día.

Composición:

Poumon histamine 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dolor de garganta

ARUM TRIPHYLLUM COMPOSÉ

Afecciones a las vías respiratorias superiores.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Arum triphyllum 3 CH, Aconitum napellus 3 CH, Rumex crispus 3 CH, Drosera rotundifolia 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Argentum nitricum 3 CH, Grindelia robusta 3 CH.

Excipientes:

Gránulos: sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

HOMEOGENE 9

Tratamiento sintomático de ronqueras, dolores de garganta, faringitis y laringitis.



Comprimidos: caja de 60

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca 2 comprimidos cada hora, espaciando las tomas según vaya mejorando.

Composición:

Mercurius solubilis 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Bryonia 3 CH, Bromum 3 CH, Belladonna 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Arnica montana 3 CH - a.a. 0,667 mg.

Excipientes:

Sacarosa (0,189 g), talco, estearato magnésico, goma arábica. 1 comprimido de 0,2 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dolor de garganta

HOMEOVOX

Afonía, ronquera y fatiga de las cuerdas vocales.

Comprimidos recubiertos: caja de 40

Posología y forma de administración:

- **Prevención:** Disolver en la boca 2 comprimidos 5 veces al día.
- **Tratamiento sintomático:** Disolver en la boca 2 comprimidos cada hora. Espaciar las tomas según mejoría.

Composición:

Aconitum napellus 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Ferrum phosphoricum 6 CH, Calendula 6 CH, Spongia tosta 6 CH, Belladonna 6 CH, Mercurius solubilis 6 CH, Hepar sulfur 6 CH, Kalium bichromicum 6 CH, Populus candicans 6 CH, Bryonia dioica 3 CH. a.a.

Excipientes:

Sacarosa (0,178 g), lactosa (0,087 g), almidón, talco, estearato magnésico, acacia, goma arábica, gelatina, cera blanca, cera de carnauba. c.s.p. 1 comprimido recubierto de 0,3 g.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:
Este medicamento contiene Hepar sulfur 6 CH, lo que debe ser tenido en cuenta en caso de otitis o sinusitis (Ver ⓘ).

PLANTSPRAY

Tratamiento sintomático de las inflamaciones de la esfera bucofaríngea: anginas, aftas, estomatitis, gingivitis y dolor de garganta.

Frasco aerosol de 20 ml

Posología y forma de administración:

Pulverizar de 6 a 8 veces al día hasta la desaparición de los síntomas.

Composición:

Plantago lanceolata TM 2 ml, Echinacea purpurea TM 2 ml.

Excipientes:

Agua purificada, glicerol (E-422), etanol al 23% V/V y l-carvone c.s.p. 20 ml.

Advertencias: Cada ml de Plantspray contiene 0,23 ml de etanol. Plantspray por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas, pudiendo provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Dolor de garganta

ARUM TRIPHYLLUM 7 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de disfonía, voz bitonal, ronquera e inflamación y cansancio de las cuerdas vocales.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 4 veces al día.

Composición:
Arum triphyllum 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

BELLADONNA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de anginas agudas, con inflamación de color rojo intenso, de aparición brusca y con abatimiento.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 4 veces al día.

Composición:
Belladonna 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

OSCILLOCOCCINUM

Tratamiento sintomático de los estados gripales y durante el periodo de exposición gripal.

6 envases unidosis de glóbulos de 1 g cada uno

Posología y forma de administración:

- **Durante el periodo de exposición gripal:** Tomar un envase unidosis a la semana.
- **Al inicio del estado gripal:** Tomar un envase unidosis lo antes posible, en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Si es necesario, repetir la toma de un envase unidosis cada 6 horas, 2 ó 3 veces.
- **En un estado gripal declarado:** Tomar un envase unidosis por la mañana y otro por la noche durante 3 días.

Vaciar directamente el contenido entero de un tubo dosis bajo la lengua manteniéndolo hasta su disolución.

Composición:
Anas barbariae 200 K 0,01 ml.

Excipientes:
Sacarosa (0,85 g), lactosa (0,15 g). c.s.p. 1 g de glóbulos.

Advertencia: (Ver ⓘ).

OSCILLOCOCCINUM

Tratamiento sintomático de los estados gripales y durante el periodo de exposición gripal.

30 envases unidosis de glóbulos de 1 g cada uno

Posología y forma de administración:

- **Durante el periodo de exposición gripal:** Tomar un envase unidosis a la semana.
- **Al inicio del estado gripal:** Tomar un envase unidosis lo antes posible, en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Si es necesario, repetir la toma de un envase unidosis cada 6 horas, 2 ó 3 veces.
- **En un estado gripal declarado:** Tomar un envase unidosis por la mañana y otro por la noche durante 3 días.

Vaciar directamente el contenido entero de un tubo dosis bajo la lengua manteniéndolo hasta su disolución.

Composición:
Anas barbariae 200 K 0,01 ml.

Excipientes:
Sacarosa (0,85 g), lactosa (0,15 g). c.s.p. 1 g de glóbulos.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Gripe

ACONITUM COMPOSÉ

Tratamiento en estados inflamatorios y estados gripales.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Aconitum napellus 3 CH, Bryonia 3 CH, Eupatorium perfoliatum 3 CH, Ferrum phosphoricum 3 CH, Apis mellifica 3 CH, Mercurius dulcis 3 CH, Arnica montana 3 CH.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

PARAGRIPPE

Estados gripales incipientes y declarados.
Alivio de los estados febriles con sensación de dolor muscular, escalofríos y dolor de cabeza.

Comprimidos: caja de 40



Posología y forma de administración:

2 comprimidos cada hora. Espaciar según mejoría.

Composición:

Arnica 4 CH, Belladonna 4 CH, Eupatorium perfoliatum 4 CH, Gelsemium 4 CH, Sulfur 5 CH - a.a.

Excipientes:

Sacarosa (0,225 g), lactosa (0,072 g), estearato magnésico. c.s.p. 1 comprimido de 0,3 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Gripe

ACONITUM NAPELLUS 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de fiebre alta de aparición brusca, sin transpiración.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos de 2 a 4 veces al día.

Composición:
Aconitum napellus 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

BELLADONNA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de fiebre alta de aparición brusca, a veces oscilante, con sudores profusos, cefalea pulsátil.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos de 2 a 4 veces al día.

Composición:
Belladonna 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Gripe

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de fiebre en meseta, sin sed, con escalofríos, temblores, dolores musculares y postración.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 4 ó 5 veces al día.

Composición:
Gelsemium sempervirens 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Rinitis

ALLIUM CEPA COMPOSÉ

Tratamiento de las corizas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:
Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Euphrasia officinalis 3 CH, Mercurius dulcis 3 CH, Hydrastis canadensis 3 CH, Kalium bichromicum 3 CH, Sambucus nigra 3 CH.

Excipientes:
Gránulos: sacarosa, lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

CORYZALIA

Alivio de los síntomas de los catarros y rinitis.



Comprimidos recubiertos: caja de 40

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca 2 comprimidos cada hora. Espaciar las tomas según mejoría.

Composición:

Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Sabadilla 3 CH, Kalium bichromicum 3 CH, Gelsemium sempervirens 3 CH, Pulsatilla 3 CH - aa 0,333 g.

Excipientes:

Sacarosa (0,275 g), talco, estearato magnésico, goma arábica, gelatina, cera de carnauba, cera blanca. c.s.p.: 1 comprimido recubierto de 0,30 g

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Este medicamento contiene Pulsatilla 3 CH, lo que debe ser tenido en cuenta en caso de otitis o sinusitis (Ver ⓘ).

HOMEOPLASMINE

Irritaciones de la piel.

Pomada: tubo de 40 g

Posología y forma de administración:

Aplicar una capa fina en la zona afectada de 1 a 3 veces al día.

Composición:

Calendula officinalis TM 0,1 g, Phytolacca decandra TM 0,3 g, Bryonia dioica TM 0,1 g, Benzoe TM 0,1 g, Acido bórico 3 g.

Excipientes:

Vaselina c.s.p. 100 g.

Contraindicaciones: No utilizar en niños menores de 3 años. No aplicar en lesiones infectadas o supurantes.
Advertencias y precauciones especiales de empleo: Por contener ácido bórico, este medicamento no debe utilizarse de forma prolongada ni repetida, sobre piel lesionada (principalmente piel escoriada y quemaduras), sobre una superficie extensa ni con vendajes oclusivos, particularmente en niños. Embarazo y lactancia: No aplicar en los senos durante la lactancia. (Ver ⓘ).

Rinitis

ALLIUM CEPA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de catarro con rinorrea irritante y lagrimeo no irritante.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos cada 2 horas, espaciando según mejoría.

Composición:
Allium cepa 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

KALIUM BICHROMICUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de coriza que cursa con dolor y presión en la raíz nasal. Producción de un moco espeso, viscoso, amarillo o amarillo verdoso; a veces sanguinolento, pegajoso, que puede formar costras en las fosas nasales.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Kalium bichromicum 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Rinitis

KALIUM SULFURICUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de coriza. Inflamación de las vías respiratorias superiores con rinorrea amarillenta o amarillo verdosa que empeora con el calor.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Kalium sulfuricum 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Sinusitis

KALIUM BICHROMICUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de sinusitis maxilar y frontal que empeora con el frío, con moco espeso, viscoso y amarillo verdoso.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Kalium bichromicum 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Sinusitis

KALIUM IODATUM 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de sinusitis frontal con rinorrea acuosa, ardiente, que empeora con el calor. Coriza.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 4 veces al día.

Composición:

Kalium iodatum 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Tos

DROSETUX

Tratamiento de la tos no productiva (seca, irritativa).

Jarabe: frasco de 150 ml

Posología y forma de administración:

- **Adultos:**
1 toma de 15ml
3 a 5 veces al día.

- **Niños menores de 5 años:**
1 toma de 2,5ml
3 a 4 veces al día.

- **Niños a partir de 5 años:**
1 toma de 5ml 3 a 5 veces al día.

Medir los mililitros necesarios con ayuda del vaso dosificador. Las tomas deben repartirse a lo largo del día y al acostarse.

Composición:

Drosera rotundifolia 3 CH, Arnica Montana 3 CH, Belladonna 3 CH, Artemisia cina 3 CH, Coccus cacti 3 CH, Corallium rubrum 3 CH, Cuprum gluconicum 3 CH, Ferrum phosphoricum 3 CH, Uragoga ipecacuanha 3 CH, Solidago virga aurea 1 CH.

Excipientes:

Jarabe simple, benzoato de sodio, ácido cítrico y agua purificada c.s.p. 150 ml.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Antes de prescribir un tratamiento antitusivo, es imprescindible descartar aquellas causas que requieran un tratamiento etiológico específico.
Advertencias sobre excipiente: Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Este medicameto contiene: Cada 2,5 ml de DROSETUX jarabe contienen 2,1 g de sacarosa. Cada 5 ml de DROSETUX jarabe contienen 4,2 g de sacarosa. Cada 15 ml de DROSETUX jarabe contienen 12,6 g de sacarosa, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. (Ver ⓘ).

Tos

STODAL (Jarabe)

Tratamiento sintomático de la tos.

Jarabe: frasco de 200 ml

Posología y forma de administración:

- **Adultos:**
  1 toma de 15 ml
  3 a 5 veces al día.
- **Niños:**
  1 toma de 5 ml
  3 a 5 veces al día.

Medir los mililitros con ayuda del vaso dosificador.

Composición:

Anemone pulsatilla 6 CH, Rumex crispus 6 CH, Bryonia dioica 3 CH, Ipeca 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Sticta pulmonaria 3 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Myocarde 6 CH, Coccus cacti 3 CH, Drosera TM - aa 0,95 g. Jarabe de Tolú 19 g, Jarabe de Polygala 19 g.

Excipientes: Sacarosa, agua purificada, etanol, caramelo y ácido benzóico E-210 c.s.p. 100 g.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Antes de prescribir un tratamiento antitusivo, es imprescindible descartar aquellas causas que requieran un tratamiento etiológico específico.
Advertencias sobre excipientes: Este medicamento contiene 3,75 g de sacarosa por 5 ml lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasaisomaltasa, y en pacientes con diabetes mellitus. Este medicamento contiene 1,74% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 0,069 g por 5 ml de STODAL jarabe, lo que puede ser perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia. (Ver ⓘ).

STODAL (Gránulos)

Tratamiento sintomático de la tos.

Gránulos: 2 tubos de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua cada hora y espaciar según mejoría.

Composición: Anemone pulsatilla 3 CH, Rumex crispus 6 CH, Bryonia dioica 3 CH, Ipecacuanha 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Sticta pulmonaria 3 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Myocarde 6 CH, Coccus cacti 3 CH.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. c.s.p. 4 g.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Este medicamento contiene Pulsatilla 3 CH, lo que debe ser tenido en cuenta en caso de otitis o sinusitis. Antes de prescribir un tratamiento antitusivo, es imprescindible descartar aquellas causas que requieran un tratamiento etiológico específico (Ver ⓘ).

IPECA COMPOSÉ

Tratamiento de afecciones bronco pulmonares, catarros agudos o crónicos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Ipeca 3 CH, Antimonium tartaricum 3 CH, Drosera rotundifolia 3 CH, Anemone pulsatilla 3 CH, Phellandrium aquaticum 3 CH, Ferrum phosphoricum 3 CH, Antimonium sulfuratum aureum 3 CH, Bryonia 3CH.

Excipientes:

Gránulos: sacarosa, lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

ANTIMONIUM TARTARICUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de inflamación de las vías respiratorias superiores con expectoración difícil que empeora tumbado.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada 2 horas, espaciando según mejoría.

Composición:

Antimonium tartaricum 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

COCCUS CACTI 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de tos catarral quintosa de noche y al despertar, con mucosidades filiformes.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos después de cada quinta de tos.

Composición:
Coccus cacti 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

DROSERA 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de tos quintosa, espasmódica y que empeora por la noche y con el calor.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos después de cada quinta.

Composición:
Drosera 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

RUMEX CRISPUS 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de tos seca al respirar aire frío.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos cada 2 horas.

Composición:
Rumex crispus 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SAMBUCUS NIGRA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de tos asmática, tos espasmódica, disnea asmática nocturna.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos cada 10 minutos hasta mejoría.

Composición:
Sambucus nigra 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Tos

SPONGIA TOSTA 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de tos asmática, tos espasmódica e inflamación de las cuerdas vocales.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos después de cada quinta de tos.

Composición:
Spongia tosta 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Otros

SCROFULARIA COMPOSÉ

Estados linfáticos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:
Scrofularia nodosa 3 CH, Mercurius dulcis 3 CH, Anemone pulsatilla 3 CH, Belladonna 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH, Conium maculatum 3 CH, Calcarea iodata 3 CH, Solidago virga aurea 3 DH.

Excipientes:
Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Infección urinaria

PAREIRA BRAVA COMPOSÉ*

Tratamiento de las afecciones renales.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

Disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día.

Composición:

Pareira brava 3 CH, Berberis vulgaris 3 CH, Arsenicum album 3 CH, Terebinthina 3 CH, Mercurius corrosivus 3 CH, Sarsaparilla 3 CH, Solidago virga aurea 3 DH, Apocynum cannabinum 3 DH, Uva ursi 3 DH.

Excipientes:

Sacarosa, lactosa. Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencias: (Ver ⓘ).

CANTHARIS VESICATORIA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de infección urinaria aguda con dolor antes y durante la micción.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos en cada micción.

Composición:

Cantharis vesicatoria 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Infección urinaria

PAREIRA BRAVA 7 CH*

Frecuentemente utilizado como coadyuvante en caso de dolor espasmódico de las vías urinarias.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos después de cada micción dolorosa.

Composición:

Pareira brava 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SERUM ANTICOLIBACILLAIRE 7 CH*

Frecuentemente utilizado como coadyuvante en caso de infección urinaria banal.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 2 veces al día.

Composición:

Serum anticolibacillaire 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

PLANTSPRAY

Tratamiento sintomático de las inflamaciones de la esfera bucofaríngea: anginas, aftas, estomatitis y gingivitis

Frasco aerosol de 20 ml

Posología y forma de administración:

Pulverizar de 6 a 8 veces al día hasta la desaparición de los síntomas.

Composición:

Plantago lanceolata TM 2 ml, Echinacea purpurea TM 2 ml.

Excipientes:

Agua purificada, glicerol (E-422), etanol al 23% V/V y l-carvone c.s.p. 20 ml.

Advertencias: Cada ml de Plantspray contiene 0,23 ml de etanol. Plantspray por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas, pudiendo provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

BORAX 5 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de aftas en la parte interna de la mejilla con líquido opaco, sangrantes.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos 3 veces al día.

Composición:

Borax 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cefalea

CEPHYL

Alivia el dolor leve o moderado en cefaleas y neuralgias.

Caja de 50 comprimidos

Posología y forma de administración:

Disolver en la boca dos comprimidos cada hora. Espaciar la toma según mejoría.

Composición:

Belladonna 4CH, Iris versicolor 4CH, Nux vomica 4CH, Spigelia 4CH, Geisemium 4CH.

Excipientes:

Sacarosa (19 mg), lactosa (180 mg) y estearato de magnesio c.s.p. 1 comprimido de 0,20 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cinetosis

COCCULINE

Prevención y tratamiento del mareo y las náuseas.

Comprimidos: caja de 30

Posología y forma de administración:

Tomar 2 comprimidos la víspera del viaje y 2 comprimidos justo antes de la salida. Repetir la toma de 2 comprimidos 1 ó 2 veces en caso de aparición de síntomas durante el viaje.

Composición:

Cocculus indicus 4 CH, Nux vomica 4 CH, Tabacum 4 CH, Petroleum 4 CH.

Excipientes:

Sacarosa (0,112 g), lactosa (0,036 g), estearato magnésico. aa c.s.p. 1 comprimido de 0,15 g.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Cinetosis

COCCULUS INDICUS 7 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de mareo en vehículos que mejora con el calor o cerrando las ventanillas y que empeora comiendo.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos una hora antes de la salida y repetir la toma al inicion del viaje. Repetir según necesidad.

Composición:

Cocculus indicus 7 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Dentición

CHAMOMILLA VULGARIS 15 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de dolor, irritabilidad y diarrea debidas a la dentición.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada 15 minutos espaciando según mejoría. Disolver en el biberón o en un poco de agua.

Composición:

Chamomilla vulgaris 15 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Hemorragias

ERIGERON CANADENSIS 5 CH*

Frecuentemente utilizado como coadyuvante en caso de hemorragias. Epistaxis que empeoran con el movimiento.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada media hora espaciando según mejoría.

Composición:

Erigeron canadensis 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

MILLEFOLIUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de epistaxis sin dolor.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada media hora espaciando según mejoría.

Composición:

Millefolium 5 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Hemorragias

CHINA RUBRA 7 CH*

Frecuentemente utilizado como coadyuvante en casos de hemorragias, anemias hiposiderémicas por hemorragias.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
China rubra 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

PHOSPHORUS 7 CH*

Frecuentemente utilizado como coadyuvante en casos de hemorragias abundantes y repetidas en las diferentes mucosas y en heridas.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos cada 6 horas.

Composición:
Phosphorus 7 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Hiperglucemia

URANIUM NITRICUM 5 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de hiperglucemia y estados glucosúricos.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Uranium nitricum 5 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insolación

BELLADONNA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de insolación. Cefaleas congestivas pulsátiles. Enrojecimiento de la cara, con sudores.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 3 veces al día.

Composición:
Belladonna 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Insolación

GLONOINUM 9 CH*

Frecuentemente utilizado en caso de insolación. Congestión cefálica.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada hora espaciando según mejoría.

Composición:

Glonoinum 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Preoperatorio

ARGENTUM NITRICUM 30 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de miedo por anticipación con agitación, precipitación y con diarrea emotiva. Insomnio.

Dosis de 1 g de glóbulos

Posología y forma de administración:

Tomar el contenido entero de una dosis la víspera por la tarde y otra dosis una hora antes de la intervención.

Composición:

Argentum nitricum 30 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada dosis de 1 gramo de glóbulos contiene 0,85 g de sacarosa y 0,15 g de lactosa

Advertencia: (Ver ⓘ).

Preoperatorio

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 30 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de miedo por anticipación con obnubilación, pérdida de confianza, fallos de memoria, temblores y diarrea emotiva. Insomnio.

Dosis de 1 g de glóbulos

Posología y forma de administración:

Tomar el contenido entero de una dosis la víspera por la tarde y otra dosis una hora antes de la intervención.

Composición:

Gelsemium sempervirens 30 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada dosis de 1 gramo de glóbulos contiene 0,85 g de sacarosa y 0,15 g de lactosa

Advertencia: (Ver ⓘ).

Postoperatorio

ARNICA MONTANA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en cuidados postoperatorios para reducir el dolor y la inflamación.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:

5 gránulos cada hora, espaciando según mejoría.

Composición:

Arnica montana 9 CH.

Excipientes:

Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

Postoperatorio

CHINA RUBRA 9 CH*

Frecuentemente utilizado en casos de adinamia de las convalecencias.

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
China rubra 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

STAPHYSAGRIA 9 CH*

Frecuentemente utilizado para aliviar los dolores postoperatorios (heridas quirúrgicas, por incisiones…).

Gránulos: tubo de 4 g de gránulos

Posología y forma de administración:
5 gránulos 2 veces al día.

Composición:
Staphysagria 9 CH.

Excipientes:
Sacarosa y lactosa.
Cada 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Advertencia: (Ver ⓘ).

SUMARIO

INFORMACIÓN GENERAL

– modo de empleo . . . . . Pág. 94
– advertencias . . . . . Pág. 94

BIBLIOGRAFÍA

. . . . . Pág. 95

ÍNDICE POR PATOLOGÍAS

. . . . . Pág. 96

ÍNDICE POR ORDEN ALFABÉTICO

. . . . . Pág. 107

ÍNDICE DE COMPOSÉS

. . . . . Pág. 111

ÍNDICE DE POMADAS

. . . . . Pág. 113

INFORMACIÓN GENERAL

- **CONTENIDO EN AZÚCAR DE LOS GRÁNULOS Y GLÓBULOS**

1 tubo de 80 gránulos aproximadamente = 3,4 g de sacarosa y 0,6 g de lactosa.
5 gránulos = 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.
1 dosis de 1 g de glóbulos contiene 0,15 g de lactosa y 0,85 g de sacarosa.
1 terrón de azúcar = 5 g de sacarosa.

La lactosa que utilizamos en Boiron se obtiene de la leche de vaca, y puede contener COMO MÁXIMO un 0,02% de proteínas de leche. Nuestros gránulos neutros contienen un 15% de lactosa y un 85% de sacarosa, es decir que 1 gránulo contiene 7,5 mg de lactosa. Por lo tanto, un gránulo contiene como máximo 0.0015 mg (el 0,02% de 7,5 mg) de proteínas.

- **MODO DE EMPLEO**

Los gránulos y glóbulos se toman vía oral, por absorción sublingual. También se pueden triturar o disolver en un poco de agua.

Modo de empleo del tubo de gránulos

1) Girar el tapón hasta obtener 5 gránulos.



2) Quitar el tapón.



3) Verter el contenido del tapón debajo de la lengua y dejar que se deshaga.

Modo de empleo del tubo-dosis de glóbulos

1) Girar y tirar del tapón suavemente hacia arriba.



2) Verter el contenido entero del tubo-dosis debajo de la lengua y dejar que se deshaga.

ADVERTENCIAS:

LACTOSA

Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar medicamentos que contengan lactosa.

SACAROSA

Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar medicamentos que contengan sacarosa.

ETANOL

Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y poblaciones de alto riesgo, como pacientes con enfermedades hepáticas o epilepsia.

ALMIDÓN

El almidón que se utiliza para la elaboración de los productos BOIRON no contiene gluten, ya que se obtiene del maíz y de la patata.

CONTRAINDICACIONES GENERALES

No debe administrar un medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado.

LEGISLACIÓN ACTUAL RELATIVA A LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Según el Artículo 50 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el obtenido a partir de sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o en la Real Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de forma oficial en un país de la Unión Europea. Un medicamento homeopático podrá contener varios principios activos.

En el Real Decreto 1345/2007, se contemplan las dos categorías que existen de medicamentos homeopáticos:

- Con indicación terapéutica aprobada.
- Sin indicación terapéutica aprobada.

Tras el estudio del paciente y de su enfermedad, se decide cómo y cuándo se utiliza cada medicamento homeopático, estimando en cada caso si el tratamiento homeopático es la terapia apropiada.

Medicamento con *: se trata de un medicamento incluido en la categoría "Medicamento homeopático sin indicación terapéutica probada" conforme a la Disposición Transitoria sexta del RD 1345/2007. Las indicaciones reflejadas en el documento son las descritas en la bibliografía para la patología indicada.

BIBLIOGRAFÍA

Dr. ALLEN
The Encyclopedia of pure materia medica.

Dr. CLARKE
A dictionary of Practical Materia Médica, Vol. I-II-III, 1993 (reedición).

Dres. D. DEMARQUE, J. JOUANNY, B. POITEVIN, Y. SAINT-JEAN
Farmacología y Materia médica, 1997.

Dres. M. GUERMONPREZ, M. PINKAS, M. TORCK
Matière médicale homéopathique, 1997 (2ª ed).

Dr. J.T. KENT
Matière Médicale Homéopathique, Vol. 1 y 2. 1992

Dr. LATHOUD
Materia Médica Homeopática, 1988.

Dr. H. VOISIN
Matière médicale du practicien homéopathe, 1999 (2ª ed.).

Dr. P. ZISSU
Matière Médicale Homéopathique Constitutionnelle, Vol. 1-2-3, 1989 (2ª ed.)

Índice por patologías

Acidez

Gastrocynesine 33
Nux vomica composé 33
Robinia pseudoacacia 5 CH . . .35

Acné

Eugenia jambosa 5 CH 21
Sanguinaria canadensis 5 CH .21

Aerofagia

Gastrocynesine 33
Carbo vegetabilis 5 CH 34

Afecciones bucofaríngeas

Plantspray 83

Afonía

Arum triphyllum composé 64
Homeovox 65

Aftas

Plantspray 83
Borax 5 CH 83

Agujetas

Cuprum metallicum 9 CH 53

Alergia al polen

Pollens 30 CH 63
Caja de 6 dosis
Poumon histamine 15 CH 63

Ampollas

Crema calendula TM 24
Homeoplasmine 24
Cantharis vesicatoria 5 CH . . .26

Anginas agudas

Homeogene 9 64
Homeovox 65
Belladonna 9 CH 66

Ansiedad

Sedatif PC 5
Argentum nitricum 9 CH 6
Gelsemium sempervirens 9 CH . .6
Ignatia amara 9 CH 7

Arañazos

Cicaderma 25
Homeoplasmine 24

Ardores de estómago

Gastrocynesine 33
Nux vomica composé 33

Índice por patologías

Artralgias

Arthrodrainol 56
Rhus toxicodendron composé . . .56
Apis mellifica 15 CH 57
Bryonia alba 9 CH 57
Rhododendron 5 CH 58
Rhus toxicodendron 9 CH 58
Ruta graveolens 5 CH 59

Bronquitis

Stodal Jarabe 75
Stodal Gránulos 75

Calambres

Cuprum metallicum 9 CH 53

Cansancio físico

Acidum phosphoricum composé . .7
Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica TM 60
Cuprum metallicum 9 CH 53

Cansancio intelectual

Acidum phosphoricum composé . .7
Cereales germinados 8

Catarros

Allium cepa composé 70
Coryzalia 71
Homeoplasmine 71
Allium cepa 9 CH 72
Kalium bichromicum 9 CH 72
Kalium sulfuricum 9 CH 73

Cefaleas

Cephyl 84
Lachesis mutus 7 CH 48

Cicatrices queloides

Graphites 7 CH 22

Cicatrización

Crema calendula TM 24
Homeoplasmine 24
Cicaderma 25

Cinetosis

Cocculine 84
Cocculus indicus 7 CH 85

Cistitis

Pareira brava composé 81
Cantharis vesicatoria 9 CH 81
Pareira brava 7 CH 82
Serum anticolibacillaire 7 CH . .82

Colesterol, estados hipercolesterolémicos

Strontium composé 13
Cholesterinum 15 CH 13

Índice por patologías

Cólicos del lactante

Nux vomica composé gotas 31
Nux vomica composé jarabe . . .33
Aethusa cynapium 5 CH 31
Colocynthis 30 CH 32
Nux vomica 5 CH 32

Comedón

Eugenia jambosa 5 CH 21

Congestión nasal

Allium cepa composé 70
Coryzalia 71
Allium cepa 9 CH 72
Kalium bichromicum 9 CH 72
Kalium sulfuricum 9 CH 73

Congestión pélvica

Sepia composé 51

Contusiones

Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica TM 60
Arnica montana 9 CH 61

Convalecencia

Jenoverine 54
Osteocynesine 54
China rubra 9 CH 91

Corizas agudas

Allium cepa composé 70
Coryzalia 71
Allium cepa 9 CH 72
Kalium bichromicum 9 CH 72
Kalium sulfuricum 9 CH 73

Crecimiento

Jenoverine 54
Osteocynesine 54

Dentición

Chamomilla vulgaris15 CH 85

Dermatitis

Saponaria composé 23
Graphites 7 CH 22
Mezereum 5 CH 22

Descalcificación

Jenoverine 54
Osteocynesine 54
Calcarea composé 53
Calcarea phosphorica 5 CH . .55
Silicea 9 CH 55

Descongestionante nasal

Coryzalia 71

Despertares nocturnos

Homeogene 46 9
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8

Índice por patologías

Diarrea

Aloe composé 37
Antimonium crudum 7 CH 34
China rubra 7 CH 37
Podophyllum peltatum 7 CH . . .38
Ricinus communis 7 CH 39

Diarrea de la dentición

Chamomilla vulgaris 15 CH . . .85

Diarrea de origen biliar

Ricinus composé 36

Disfonía

Arum triphyllum composé 64
Homeogene 9 64
Homeovox 65
Arum triphyllum 7 CH 66

Dismenorrea

Actaea racemosa 7 CH 48
Caulophyllum 7 CH 49
Colocynthis 7 CH 49

Disnea

Sambucus nigra 5 CH 78

Dispepsia

Gastrocynesine 33
Nux vomica composé 31

Dolor de garganta

Arum triphyllum composé 64
Homeogene 9 64
Homeovox 65
Plantspray 65
Arum triphyllum 7 CH 66
Belladonna 9 CH 66

Dolor menstrual

Actaea racemosa 7 CH 48
Caulophyllum 7 CH 49
Colocynthis 7 CH 49

Dolor muscular

Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica TM 60
Arnica montana 9 CH 61

Dolor osteomuscular y articular

Arthrodrainol 56
Rhus toxicodendron composé . . .56
Apis mellifica 15 CH 57
Bryonia alba 9 CH 57
Rhododendron 5 CH 58
Rhus toxicodendron 9 CH 58
Ruta graveolens 5 CH 59

Índice por patologías

Drenaje cutáneo

Saponaria composé 23

Drenaje hepático

Chelidonium composé 36

Eczemas

Saponaria composé 23
Graphites 7 CH 22
Mezereum 5 CH 22

Epistaxis

Erigeron canadensis 5 CH 86
Millefolium 5 CH 86

Episotomía

Apis mellifica 15 CH 43
Staphysagria 15 CH 43

Equimosis

Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica TM 60
Arnica montana 9 CH 61
Ledum palustre 5 CH 61

Eritema solar

Cicaderma 25

Escaras

Secale cornutum 5 CH 29

Esguinces

Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica TM 60
Ruta graveolens 5 CH 59

Estados verminosos

Cina 9 CH 39

Estrés

Sedatif PC 5
Argentum nitricum 9 CH 6
Gelsemium sempervirens 9 CH .70
Ignatia amara 9 CH 7

Expectorante

Stodal Gránulos 75
Stodal Jarabe 75
Antimonium tartaricum 5 CH . .76

Faringitis

Homeogene 9 64

Fiebre

Aconitum composé 68
Oscillococcinum 67
Paragrippe 68
Aconitum napellus 9 CH 69
Belladonna 9 CH 66
Gelsemium sempervirens 9 CH .70

Índice por patologías

Fisuras anales

Avenoc pomada 14
Avenoc supositorios 15
Paeonia officinalis 5 CH 16
Ratanhia officinalis 5 CH 16

Fracturas

Jenoverine 54
Osteocynesine 54
Calcarea phosphorica 5 CH . .55
Symphytum 5 CH 62

Grietas

Homeoplasmine 71
Cicaderma 25

Gripe y síntomas gripales

Aconitum composé 68
Oscillococcinum 67
Paragrippe 68
Aconitum napellus 9 CH 69
Belladonna 9 CH 69
Gelsemium sempervirens 9 CH .70

Gota

Rhus toxicodendron composé . . .56

Hemorragias

Erigeron canadensis 5 CH 86
Millefolium 5 CH 86
China rubra 7 CH 87
Phosphorus 7 CH 87

Hemorroides

Aesculus composé 14
Avenoc pomada 14
Avenoc supositorios 15
Aesculus hippocastanum 5 CH .15
Paeonia officinalis 5 CH 16
Ratanhia officinalis 5 CH 16

Heridas superficiales

Cicaderma 25
Homeoplasmine 71

Hiperemotividad

Sedatif PC 5
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8

Hiperglucemia

Uranium nitricum 5 CH 88

Hipersensibilidad

Sedatif PC 5
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8
Ignatia amara 9 CH 7

Indigestión

Antimonium crudum 7 CH 34

Índice por patologías

Infecciones urinarias

Pareira brava composé 81
Cantharis vesicatoria 9 CH 81
Pareira brava 7 CH 82
Serum anticollibacillaire 7 CH .82

Infección vaginal

Endhometrol 51

Insolación

Belladonna 9 CH 88
Glonoinum 9 CH 89

Insomnio ocasional

Sedatif PC 5
Homeogene 46 9
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8
Ignatia amara 9 CH 7
Coffea cruda 15 CH 10
Kalium bromatum 9 CH 10
Nux vomica 15 CH 11
Stramonium 9 CH 11

Insuficiencia venosa

Hamamelis composé 17
Hamamelis virginiana 5 CH . . .18
Fluoricum acidum 5 CH 19
Pulsatilla 5 CH 18
Vipera redi 7 CH 20

Irritación de la piel

Crema calendula TM 24
Homeoplasmine 71
Cicaderma 25

Laringitis

Arum triphyllum composé 64
Homeogene 9 64
Homeovox 65
Stodal Jarabe 75
Stodal gránulos 75
Arum triphyllum 7 CH 66
Sambucus nigra 5 CH 78

Leucorreas

Endhometrol 51

Litiasis urinaria

Pareira brava composé 81

Lombrices

Cina 9 CH 39

Luxaciones

Ruta graveolens 5 CH 59

Mareo en los viajes

Ver Cinetosis

Índice por patologías

Menopausia

Cardiocynesine 47
Lachesis mutus 7 CH 48

Menstruación, dolor

Ver Dismenorrea

Naupatía

Ver Cinetosis

Náuseas de viaje

Cocculine 84
Cocculus indicus 7 CH 85

Náuseas del embarazo

Ignatia amara 9 CH 41
Sepia officinalis 9 CH 41

Nerviosismo

Sedatif PC 5
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8
Argentum nitricum 9 CH 6
Gelsemium sempervirens 9 CH . .6
Ignatia amara 9 CH 7

Oxiurosis

Cina 9 CH 39

Parto, preparación

Actaea racemosa 9 CH 42
Caulophyllum 9 CH 42

Pesadez gástrica

Gastrocynesine 33
Nux vomica composé 31
Carbo vegetabilis 5 CH 34
Nux vomica 7 CH 35

Picaduras de insectos

Cicaderma 25
Apis mellifica 15 CH 26
Ledum palustre 5 CH 27

Piernas cansadas e inflamadas

Hamamelis composé 17
Hamamelis virginiana 5 CH . . .18
Pulsatilla 5 CH 18

Postoperatorio

Arnica montana 9 CH 90
China rubra 9 CH 91
Staphysagria 9 CH 91

Preoperatorio

Argentum nitricum 30 CH 89
Gelsemium sempervirens 30 CH ..90

Índice por patologías

Prevención de alergias a pólenes

Pollens 30 CH 63
Caja de 6 dosis

Prevención de la gripe

Oscillococcinum 67

Quemaduras cutáneas leves

Cicaderma 25
Homeoplasmine 71
Belladonna 7 CH 25

Quemaduras de segundo grado

Cantharis vesicatoria 5 CH . . .26

Reconstituyente

Cereales germinados 8
Jenoverine 54

Reflujo gastroesofágico

Gastrocynesine 33

Reumatismos

Arthrodrainol 56
Rhus toxicodendron composé . . .56
Rhododendron 5 CH 58

Rinitis

Homeoplasmine 71
Allium cepa composé 70
Coryzalia 71
Allium cepa 9 CH 72
Kalium bichromicum 9 CH 72
Kalium sulfuricum 9 CH 73

Ronquera

Arum triphyllum composé 64
Homeovox 65
Arum triphyllum 7 CH 66

Sabañones

Pomada Agaricus TM 27
Pulsatilla 5 CH 28

Síndrome premenstrual

Actaea racemosa 7 CH 48
Folliculinum 15 CH 50
Lac caninum 9 CH 50

Sinusitis

Kalium bichromicum 9 CH 73
Kalium iodatum 7 CH 74

Sofocos

Cardiocynesine 47
Lachesis mutus 7 CH 48

Subida de leche, dolor

Apis mellifica 9 CH 45
Bryonia Alba 9 CH 46
Belladonna 9 CH 46
Phytolacca 15 CH 47

Subida de leche, estimulación

Alfalfa 6 DH 44
Ricinus communis 5 CH 44

Índice por patologías

Subida de leche, inhibición

Ricinus communis 30 CH 45

Sueño, trastornos

Sedatif PC 5
Homeogene 46 9
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8
Ignatia amara 9 CH 7
Coffea cruda 15 CH 10
Kalium bromatum 9 CH 10
Stramonium 9 CH 11
Nux vomica 15 CH 11

Taquicardia

Strophantus composé 19
Lycopus virginicus 7 CH 20

Tendinitis

Ruta graveolens 5 CH 59

Terrores nocturnos

Homeogene 46 9
Kalium bromatum 9 CH 10
Stramonium 9 CH 11

Tos

Drosetux 74
Ipeca composé 76
Stodal Jarabe 75
Stodal Gránulos 75
Antimonium tartaricum 5 CH . .76
Coccus cacti 7 CH 77
Drosera 7 CH 77
Rumex crispus 5 CH 78
Sambucus nigra 5 CH 78
Spongia tosta 5 CH 79

Traqueítis

Arum triphyllum composé 64
Stodal Jarabe 75
Stodal Gránulos 75

Trastornos anímicos

Acidum phosphoricum composé . .7
Cereales germinados 8

Trastornos digestivos

Gastrocynesine 33
Nux vomica composé 31

Trastornos hepatobiliares

Chelidonium composé 36
Ricinus composé 36

Traumatismos

Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica TM 60
Arnica montana 9 CH 61
Ledum palustre 5 CH 61
Symphytum 5 CH 62

Úlceras varicosas

Fluoricum acidum 5 CH 19

Índice por patologías

Urticaria

Urtica urens 9 CH 29

Vaginitis

Endhometrol 51

Varices

Hamamelis composé 17
Hamamelis virginiana 5 CH . . .18
Pulsatilla 5 CH 18
Fluoricum acidum 5 CH 19

Vegetaciones

Scrofularia composé 79

Verrugas

Thuya occidentalis 7 CH 28

Índice por orden alfabético

Acidum phosphoricum composé 7
Aconitum composé 68
Aconitum napellus 9 CH 69
Actaea racemosa 7 CH 48
Actaea racemosa 9 CH 42
Aesculus composé 14
Aesculus hippocastanum 5 CH 15
Aethusa cynapium 5 CH 31
Agaricus TM, pomada 27
Alfalfa 6 DH 44
Allium cepa 9 CH 72
Allium cepa composé 70
Aloe composé 37
Antimonium crudum 7 CH 34
Antimonium tartaricum 5 CH 76
Apis mellifica 9 CH 45
Apis mellifica 15 CH 26, 43, 57
Argentum nitricum 9 CH 6
Argentum nitricum 30 CH 89
Arnica composé 59
Arnica compositum 60
Arnica montana 9 CH 61, 90
Arnica TM 60
Arthrodrainol 56
Arum triphyllum 7 CH 66
Arum triphyllum composé 64
Avenoc pomada 14
Avenoc supositorios 15
Belladonna 7 CH 25
Belladonna 9 CH 46, 66, 69, 88
Borax 5 CH 83
Bryonia alba 9 CH 46, 57
Calcarea phosphorica 5 CH 55
Caléndula TM, crema 24
Cantharis vesicatoria 5 CH 26
Cantharis vesicatoria 9 CH 81
Carbo vegetabilis 5 CH 34
Cardiocynesine 47
Calcarea composé 53
Caulophyllum 7 CH 49
Caulophyllum 9 CH 42
Cephyl 84
Cereales germinados 8

Índice por orden alfabético

Chamomilla vulgaris 15 CH 85
Chelidonium composé 36
China rubra 7 CH 37, 87
China rubra 9 CH 91
Cholesterinum 15 CH 13
Cicaderma 25
Cina 9 CH 39
Cocculine 84
Cocculus indicus 7 CH 85
Coccus cacti 7 CH 77
Coffea cruda 15 CH 10
Colocynthis 7 CH 49
Colocynthis 30 CH 32
Coryzalia 71
Cuprum metallicum 9 CH 53
Drosera 7 CH 77
Drosetux 74
Endhometrol 51
Erigeron canadensis 5 CH 86
Eugenia jambosa 5 CH 21
Fluoricum acidum 5 CH 19
Folliculinum 15 CH 50
Gastrocynesine 33
Gelsemium sempervirens 9 CH 6, 70
Gelsemium sempervirens 30 CH 90
Glonoinum 9 CH 89
Graphites 7 CH 22
Hamamelis 5 CH 17
Hamamelis composé 17
Homeogene 9 64
Homeogene 46 9
Homeoplasmine 24, 71
Homeovox 65
Ignatia amara 9 CH 7, 38, 41
Ipeca composé 76
Jenoverine 54
Kalium bichromicum 9 CH 72, 73
Kalium bromatum 9 CH 10
Kalium iodatum 7 CH 74
Kalium sulfuricum 9 CH 73
Lac caninum 9 CH 50
Lachesis mutus 7 CH 48
Ledum palustre 5 CH 27, 61
Lycopus virginicus 7 CH 20
Mezereum 5 CH 22
Millefolium 5 CH 86
Nitricum acidum 5 CH 23
Nux vomica 5 CH 32
Nux vomica 7 CH 35
Nux vomica 15 CH 11
Nux vomica composé 33
Nux vomica composé gotas (sabor plátano) 31
Oscillococcinum 67
Osteocynesine 54
Paeonia officinalis 5 CH 16
Paragrippe 68
Pareira brava 7 CH 82
Pareira brava composé 81
Passiflora composé 9
Passiflora composé jarabe 8
Phosphorus 7 CH 87
Phytolacca 15 CH 47
Plantspray 65, 83
Podophyllum peltatum 7 CH 38
Pollens 30 CH 63
Poumon histamine 15 CH 63
Pulsatilla 5 CH 18, 28
Ratanhia officinalis 5 CH 16
Rhododendron 5 CH 58
Rhus toxicodendron 9 CH 58
Rhus toxicodendron composé 56
Ricinus communis 5 CH 44
Ricinus communis 7 CH 39
Ricinus communis 30 CH 45
Ricinus composé 36
Robinia pseudoacacia 5 CH 35
Rumex crispus 5 CH 78
Ruta graveolens 5 CH 59
Sambucus nigra 5 CH 78
Sanguinaria canadensis 5 CH 21
Saponaria composé 23

Índice por orden alfabético

Scrofularia composé 79
Secale cornutum 5 CH 29
Sedatif PC 5
Sepia composé 51
Sepia officinalis 9 CH 41
Serum anticolibacillaire 7 CH 82
Silicea 9 CH 55
Spongia tosta 5 CH 79
Staphysagria 9 CH 91
Staphysagria 15 CH 43
Stodal Gránulos 75
Stodal Jarabe 75
Stramonium 9 CH 11
Strontium composé 13
Strophantus composé 19
Symphytum 5 CH 62
Thuya occidentalis 7 CH 28
Uranium nitricum 5 CH 88
Urtica urens 9 CH 29
Vipera redi 7 CH 20

Índice de Composés

Trastornos anímicos:
Cansancio
o Acidum phosphoricum composé, pág. 7
Insomnio
o Passiflora composé, pág. 9
Trastornos circulatorios:
Estados colesterolémicos
o Strontium composé, pág. 13
Hemorroides
o Aesculus composé, pág. 14
Insuficiencia venosa
o Hamamelis composé, pág. 17
Trastornos del ritmo cardiaco
o Strophantus composé, pág. 19
Trastornos dermatológicos:
Dermatitis
o Saponaria composé, pág. 23
Trastornos digestivos:
Trastornos digestivos
o Nux vomica composé, pág. 31 y 33
Trastornos hepatobiliares
o Chelidonium composé, pág. 36
o Ricinus composé, pág. 36
Trastornos intestinales
o Aloe composé, pág. 37
Trastornos ginecológicos:
Congestión pélvica
o Sepia composé, pág. 51
Trastornos osteomusculares:
Dolores articulares
o Rhus toxicodendron composé, pág. 56
Traumatismos
o Arnica composé, pág. 59
o Arnica compositum, pág. 60
o Calcarea composé, pág. 53
Trastornos respiratorios:
Dolor de garganta
o Arum triphyllum composé, pág. 64
Gripe
o Aconitum composé, pág. 68
Rinitis
o Allium cepa composé, pág. 70
Tos
o Ipeca composé, pág. 76
Coadyuvante en estados adenoides
o Scrofularia composé, pág. 79
Trastornos urinarios:
Infección urinaria
o Pareira brava composé, pág. 81

Índice de Pomadas

Trastornos circulatorios:
Hemorroides
- Avenoc, pág. 14, 15

Insuficiencia venosa
- Hamamelis TM, pág. 17

Trastornos dermatológicos:
Inflamación aguda
- Crema calendula TM, pág. 24
- Homeoplasmine, pág. 71
- Cicaderma, pág. 25

Picaduras
- Cicaderma, pág. 25

Sabañones
- Pomada Agaricus TM, pág. 27

Trastornos ginecológicos:
Trastornos osteomusculares:
Traumatismos
- Arnica TM, pág. 60
- Arnica compositum, pág. 60

Trastornos respiratorios:
Rinitis
- Homeoplasmine, pág. 71

BOIRON MADRID

Avda. Valdelaparra, 27
28108 Alcobendas
Tel: 91 484 04 84
Fax: 91 661 24 08

BOIRON BARCELONA

C/ Durán i Jordá, s/n
08960 Sant Just Desvern
Tel: 93 470 57 10
Fax: 93 470 57 85

INFORMACIÓN RESERVADA PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Y1014